

CONOXIA 100 %, lääkkeellinen kaasu, puristettu

Linde Gas Therapeutics

AGA

Happi 100 % (O₂)

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

- Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi.

Tässä selosteessa esitetään:

1. Mitä CONOXIA on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät CONOXIA-valmistetta
3. Miten CONOXIA-valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. CONOXIA-valmisteen säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ CONOXIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

CONOXIA sisältää happea, jota käytetään inhalaatioon. Se on väritöntä, hajutonta ja mautonta, ja se toimitetaan kaasupulloissa, joissa on paineensäädin kaasun paineen pienentämistä varten. Kaasupullo sisältää puhdasta happea.

CONOXIA lisää veren happipitoisuutta (parantaa happikylläisyyttä). CONOXIA-valmistetta käytettäessä kehon kaikkiin kudoksiin kulkeutuu enemmän happea.

CONOXIA- valmistetta käytetään

- akuutin tai kroonisen hapenpuutteen hoitoon tai ehkäisemiseen
- muiden inhaloitavien lääkevalmisteiden kuljetusaineena (sumutinhoito)
- kaasuvirtauksen osana anestesiassa ja tehohoidossa.
- painekammioissa sukeltajataudista (ilmanpainetaudista) eli verisuonissa olevista kaasui- tai ilmakuplista aiheutuvien vaurioiden riskin pienentämiseen sekä vaikean häämyrkytyksen ja kaasukuolion hoitoon
- akuutin sarjoittaisen päänsäryn hoitoon.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT CONOXIA-VALMISTETTA

Jos Sinulle itsellesi on määrätty CONOXIA-valmistetta, Sinun tulee kertoa lääkärillesi, jos

- Sinulla on krooninen keuhkosairaus (esimerkiksi astma tai COPD).

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Jos käytät muita lääkkeitä, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa sivuvaikutuksia keuhkoissa, kuten bleomysiiniä (syöpälääke), hapen käyttö saman aikaisesti voi lisätä näiden lääkkeiden sivuvaikutuksia.

Raskaus ja imetys

CONOXIA-valmistetta voidaan käyttää raskauden aikana.

CONOXIA-valmistetta voidaan käyttää imetyksen aikana.

3. MITEN CONOXIA-VALMISTETTA KÄYTETÄÄN

Jos Sinulle itsellesi on määrätty CONOXIA-valmistetta, älä muuta annostusta keskustelematta asiasta ensin lääkärisi kanssa.

CONOXIA on hengitettäväksi tarkoitettu. Tavallinen aikuisen annos akuutin hapenpuutteen hoidossa tai ehkäisemisessä on 3–4 litraa minuutissa nenäkatetria käytettäessä tai 5–15 litraa minuutissa maskia käytettäessä. Muissa tapauksissa annostus tulee kysyä lääkäriltä.

CONOXIA-valmistetta hengitetään tavallisesti nenäkatettrin tai maskin kautta. Voit hengittää itse – spontaanisti – tai respiraattori tai ventilaattori voi avustaa Sinua hengittämisessä.

Lue huolellisesti hengityslaitteistosi käyttöohjeet/potilasohjeet!

Jos käytät enemmän CONOXIA-valmistetta kuin Sinun pitäisi

Joissakin tilanteissa liian suuri määrä CONOXIA-valmistetta voi haitata hengityselinten toimintaa ja poikkeustapauksissa se voi aiheuttaa hiilidioksidianestesian/tajuttomuuden.

Jos CONOXIA-valmistetta käytetään pitkään liian paljon, seurauksena voi olla kipu, kuiva yskä ja jopa hengästyneisyys.

Jos yliannostuksen merkkejä ilmenee, ota aina yhteys lääkäriin, sairaalaan tai myrkytystietokeskukseen (puh. (09) 471977).

Turvaohjeet

- CONOXIA on tarkoitettu vain lääkinnälliseen käyttöön.
- Liitä pullo vain lääkkeelliselle hapelle tarkoitettuun liitäntään.
- Happea (säiliötä ja pulloa) saa käyttää vain tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
- Kaasupulloja ei saa altistaa voimakkaalle kuumuudelle.
- Tupakointi ja avotulen teko on kielletty tiloissa, joissa CONOXIA-valmistetta käytetään, koska se lisää tulipalovaaraa.

- Älä käytä leivänpaahdinta, hiustenkuivaajaa tai vastaavaa sähkölaitetta CONOXIA-hoidon aikana.
- Älä koskaan aseta happimaskia tai nenäkatetria suoraan tekstiilin päälle hoidon aikana. Hapella kyllästyneet kankaat voivat olla erittäin herkästi syttyviä ja aiheuttaa tulipalovaaran. Ravistele ja tuuleta tekstiilit huolellisesti.
- Sulje laitteet, kun niitä ei käytetä.
- Sulje laitteet tulipalon sattuessa.
- Kaasupullot on kannettava turvaan palovaaran uhatessa.
- Älä koskaan käytä rasvaa, öljyä tai vastaavaa ainetta jumiutuneen liittimen kierteiden voiteluun, koska kosketus korkeapaineisen CONOXIA-valmisteen kanssa aiheuttaa itsesyttymisvaaran.
- Venttiili on avattava hitaasti ja varovasti.
- Käsittele pulloa varovasti. Varmista, että kaasupullo ei pääse putoamaan eikä altistu kolhuille.
- Pidä pullo puhtaana ja kuivana.
- Kaasupullot on säilytettävä ja kuljetettava venttiilit suljettuina ja mahdollinen suojatulppa ja kupu paikoillaan.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, CONOXIA-valmistekin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai hoitohenkilökunnalle.

Hoito sairaalan ulkopuolella:

Nenäkatetrin kautta annettava CONOXIA-hoito voi aiheuttaa limakalvojen kuivumista nenässä ja suussa, koska kaasu on kuivaa.

Lue myös kohta "Jos käytät enemmän CONOXIA-valmistettä kuin Sinun pitäisi".

Hoito sairaalassa:

Haittavaikutuksia ilmenee tavallisesti suuria pitoisuuksia (yli 70 %) käytettäessä ja kauan kestäneen hoidon (vähintään 6–12 tuntia) jälkeen:

- keuhkorakkuloiden kokoonpaineuminen
- hengitykseen liittyvä kipu ja kuiva yskä, akuutti keuhkojen vajaa-toiminta (ARDS).

Erittäin harvoissa tapauksissa voi ilmetä seuraavia haittavaikutuksia:

- anemia, vaikutus keuhkoihin, sydämeen, munuaisiin ja maksaan.

Vastasyntyneillä:

- verkkokalvon vaurioitumisen, joka voi johtaa näön heikkenemiseen, on katsottu mahdollisesti aiheutuvan yli 40 %:n happipitoisuuden käytöstä.

Painekammioissa annetun hoidon (ylipainehappihoito) haittavaikutukset:

- korvan tärykalvon repeämä, kipu nenän sivuontelossa, ohimenevä lihaskipu, keskushermostovaikutukset, kuten pahoinvointi, huimaus, levottomuus tai sekavuus, lihasten nykiminen, tajuttomuus ja epileptiakohtaukset. Keskushermostovaikutuksia voi ilmetä, jos hoitoa annetaan painekammiossa useita tunteja yli 2 ilmakehän ylipaineella. Oireet voivat ilmetä aiemmin, jos paine on suurempi.

5. CONOXIA-VALMISTEEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Pidä pullo tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto ja jossa se ei altistu voimakkaalle kuumuudelle.

Pidä pullo puhtaana ja kuivana.

Varmista, että kaasupullo ei pääse putoamaan eikä altistu kolhuille.

Älä säilytä helposti syttyvien materiaalien lähetyksillä.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

6. MUUTA TIETOA

Mitä CONOXIA sisältää

- Vaikuttava aine on 100 % happi (kemiallinen merkki: O₂)
- CONOXIA-valmisteessa ei ole muita ainesosia.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Kaasupullon hartiaosan väri on valkoinen (happi). Kaasupullon runko on valkoinen (lääkkeellinen kaasu). Suomessa pullon rungon väri voi myös olla sinivihreä.

Pullon koko litroina

1 • 1,1 • 1,2 • 2 • 2 x 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 10 • 15 • 20 • 50
10 x 50 • 12 x 50

Kaikkia pakkauskojoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

AGA AB
SE-181 81 Lidingö, Ruotsi

Tietoa:

Oy AGA Ab, Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo, Suomi, Puh: 010 2421

Valmistajat:

AGA AS, Strömsveien 324, NO-1081 Oslo, Norja, (Leirdal)
AGA AS, Vermlandsgade 55, DK-2300 Copenhagen S, Tanska
Oy AGA Ab, Agantie 2, 11310 Riihimäki, Suomi
ISAGA ehf, Breidhöfda 11, ICE-110 Reykjavik, Islanti
AGA SIA, Akmenu iela 66, LV-5001 Ogre, Latvia
AGA Gas AB, Rotevägen 2, SE-192 78 Sollentuna, Ruotsi

Tämä seloste on hyväksytty viimeksi

22.01.2008

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Lääkelaitoksen kotisivuilta (www.nam.fi)



Oy AGA Ab

Linde Gas Therapeutics, Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo
Puh: 010 2421, www.linde-gastherapeutics.fi